

Spoštovani!

Sporočamo, da je od dne, **6.9.2021 naprej**, v veljavi Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolewnosti, cepljenja in testiranja za zaježitev okužb z virusom SARS-CoV-2 (objavljen v Ur.l.RS, Št.142/2021, z dne, 4.9.2021).

Skladno z Odlokom **morate vsi obiskovalci izpolnjevati enega od pogojev PCT**, kar smo izvajalci dolžni dosledno preverjati. PCT dokazila predložite v recepciji.

Pogoj prebolewnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: PCT pogoj) je izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:

- 1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;*
- 2. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da ste prejeli:
– drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia's Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku;
– prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;*
- 3. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 240 dni;*
- 4. z dokazilom o prebolelosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 240 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.*

Prosimo vas, da na obisk prihajate zdravi, oziroma, da niste bili v visoko tveganem stiku ter v času obiska dosledno upoštevajte vse ukrepe za preprečevanje virusa Sars-CoV-2: pravilna uporaba kirurške zaščitne maske, razkuževanje rok, higiena kihanja, kašljanja .Zaščitne maske so potrebne tudi na zunanjih površinah v kolikor je razdalja manjša od 1,5m.

Direktor

Srečko Mlačnik, univ.dipl.psih.

Višji svetovalec

